

Torus breuk bij kinderen

Uw kind heeft een kleine breuk in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols (torus breuk). Het is een knikje in het bot. We behandelen dit met softcast (zacht gips) en een sling. Dit is een soort mitella.

De behandeling

Deze torus breuk van de pols of onderarm komt vaak voor bij kinderen. We behandelen deze breuk met softcast (zacht gips) en een sling.

| | |
|-------------|---|
| 0 - 1 weken | Sling verwijderen zodra de pijn het toelaat. |
| 1 - 2 weken | Zacht grips verwijderen, zodra de pijn het toelaat. Dit kan met een kleinde verbandschaar of door het af te wikkelen. |
| 3 - 4 weken | Vrij bewegen van de pols. |
| na 4 weken | Uw kind kan weer sporten en gymmen. |

Instructies

Volg de volgende instructies voor een goede genezing:

- Het gips en de sling houden de arm in een prettige positie
- Uw kind mag de sling afdoen zodra de pijn dit toelaat. Het gips mag na 1 à 2 weken verwijderd worden. Heeft uw kind na een week nog pijn, laat dan het gips nog 1 week zitten en verwijder het daarna.
- De breuk zit dicht bij de pols. Daarom is het belangrijk dat uw kind na 1 a 2 weken begint met bewegen. Dat voorkomt stijfheid van de pols en het bevordert de genezing en het herstel.
- Na 3 weken mag uw kind voorzichtig weer alle activiteiten uitvoeren. Dit is op geleide van de pijnklachten, dus alleen als hij/zij de pijn kan verdragen. Als het niet lukt, kan uw kind beter nog even wachten.
- Douchen mag met het gips. Na het douchen dit wel goed droogföhnen!
- Heeft uw kind pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol nemen totdat uw kind te veel pijn heeft. Neem altijd verspreid over de dag in.

Herstel

- Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De breuk geneest meestal binnen enkele weken volledig.

- Blijft uw kind pijn houden of blijft de pols minder goed functioneren? Neem dan contact met ons op. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak.

Oefeningen

Het is belangrijk dat uw kind de pols beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de pols, oefent uw kind de pols ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.

Vragen? U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact met ons op, op werkdagen tussen 9 en 11 uur. Gipsverbandmeesters:

T [076] 595 40 69

In de avond- en nachturen en in het weekend neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp:

T (076) 595 40 47

Heeft u vragen over de vergoeding en/of betaling?

Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Mogelijk voor u ook interessante patiëntfolders:

- [Amphia heet u welkom op de gipskamer](https://www.amphia.nl/folders/gipskamer-amphia-heet-u-welkom-op-de-gipskamer)
- [Gips en medische hulpmiddelen](https://www.amphia.nl/folders/gipskamer-verkrijgen-van-medische-hulpmiddelen)
- [Gips en vliegen](https://www.amphia.nl/folders/gipskamer-gips-en-vliegen)
- [Het bepalen van de pijnscore](https://www.amphia.nl/folders/gipskamer-het-bepalen-van-de-pijnscore)
- [Het genezen van een botbreuk](https://www.amphia.nl/folders/gipskamer-het-genezen-van-een-botbreuk)
- [Kinderen info met het 'klokhuis' op de gipskamer](https://www.amphia.nl/folders/gipskamer-kinderen-info-met-het-klokhuis-op-de-gipskamer)

Meer lezen over de gipskamer van Amphia?

[Ga naar afdeling Gipskamer](https://www.amphia.nl/afdelingen/gipskamer)