

Budesonide

Informatie over allergie

Inleiding

U bent overgevoelig voor de bovenvermelde stof. Ter bevordering van uw genezing en om te voorkomen dat het eczeem (of een andere huidreactie) weer optreedt, ontvangt u hierbij informatie over deze stof. Probeer 'verdachte' voorwerpen te vermijden. Deze lijst dient slechts als leidraad; het is onmogelijk om alle producten aan te geven omdat deze steeds kunnen wisselen van samenstelling.

Algemeen

Budesonide behoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschors hormonen of corticosteroiden worden benoemd. Het is een acetonide type corticosteroid. R-Budesonide is een marker van de B-groep van de corticosteroiden (zie tabel). S-budesonide is een marker van de D2-groep van corticosteroiden (zie tabel).

Gebruik en voorkomen

Budesonide wordt gebruikt in zalven, crèmes, sprays en inhalatoren.

Groepsverwante stoffen

Budesonide is verwant met andere acetonides uit groep B, zoals Kenacort en ook met enkele esters uit groep D (zie tabel).

NB:

- Meestal komen er geen kruisreacties voor met bethametason en dexamethason en derivaten. Relatief veilig zijn ook fluticasonpropionaat en mometasonfuroaat (zie tabel).
- Niet alleen kan er een allergische reactie optreden na toediening via crème of zalf maar eventueel ook na toediening via de luchtwegen of via injecties (bijvoorbeeld in een gewricht) bij gevoelige personen.

Voorbeelden van in Nederland voorgeschreven corticosteroiden

Groep A	
Hydrocortisone-type	Merknaam
Cortison (acetaat)	
Fludrocortison	Florinef, Panotile
Fluormetholonacetaat	Flarex
Hydrocortison (acetaat, natrium succinaat)	Bacicoline-B, Buccalsone, Calmurid HC, Otosporin, Proctosedyl, Solu-Cortef, Terra-Cortril.
Methylprednisolon (acetaat, natrium succinaat)	Depo-Medrol. Solu-Medrol
Prednisolon(acetaat, dinatrium-fosfaat, natrium succinaat, pivalaat)	Di-adreson-F, Pred forte, Ultracortenol
Prednison	

Tixocortol pivalaat	Pivalone
---------------------	----------

Groep B	
	Merknaam
Triamcinolonacetonide-type	
Budesonide	Budenofalk, Entocort, Pulmicort, Rhinocort, Symbicort
Fluocinolonacetonide	Synalar Bi-Otic
Triamcinolon acetonide	-Kenacort-A, Mycolog, Trianal, Nasacort

Groep C	
	Merknaam
Bethametason-type	
Bethametason (dinatrium-fosfaat)	Betnesol, Celestone
Desoximetason	Ibaril, Topicorte
Dexamethason(dinatrium-fosfaat, sulfobenzonaat)	Decadron, Dexa-pos Natrium-Dexagenta-Pos, Dexamytrex Maxitrol, Oradexon, Sofradex, tobradex
Flunisolide	Syntaris
Flumethasonpivalaat	Locacorten, Locasalen, Locacorten-Vioform

Groep D I	
	Merknaam
Betamethasonvaleraat-type (stabiele esters)	
Betamethasondipropionaat	Diprosalic, Diprosone, Diprolene, Dovobet
Bethametasonvaleraat	Betnelan, Celestoderm
Beclometason dipropionaat	Aerobec, Beconase, Qvar
Clobetasolpropionaat	Dermovate
Clobetasonbutyraat	Emovate

Fluticasonpropionaat	Cultivate, Flixotide, Flixonase, Seretide
Mometasonfuroaat	Elocon, Nasonex
Groep D 2	
Hydrocortisonbutyraat-type(labiele esters)	Merknaam
Hydrocortisonbutyraat	Locoid
Niet in te delen	
Rimexolon	Vexol

Meer lezen over dermatologie in Amphia?

[Ga naar afdeling Dermatologie \(https://www.amphia.nl/afdelingen/dermatologie\)](https://www.amphia.nl/afdelingen/dermatologie)