

## Nazorginstructie na Mohs Chirurgie

U bent vandaag door dokter:

- \_ mw. S.J. Caers
- \_ mw. dr. D.I.M. Kuijpers
- \_ mw. dr. L.C. Jacobs
- \_ B. Prens
- \_ L.C.C. Wijne

poliklinisch geopereerd aan:

- \_ Basaalcelcarcinoom
- \_ Plaveiselcelcarcinoom

Hiervoor krijgt u de onderstaande instructies voor de eerste dagen na de behandeling:

### 1. Wondbehandeling

- \_ Het drukverband en de pleister laten zitten
- \_ U mag het drukverband en de pleister indien nodig na drie dagen vervangen door een eigen pleister. De hechtstrip moet blijven zitten todat de hechtingen verwijderd worden.
- \_ Na drie dagen mag u douchen
- \_ U dient de operatiewond droog te houden
- \_ Na drie dagen wondcontrole: locatie.....

### 2. Pijnbestrijding

Bij pijn mag u 2 tabletten paracetamol van 500mg innemen met een maximum van 8 tabletten per dag.

### 3. Overig

- \_ De eerste week kunt u beter niet sporten
- \_ Niet te zwaar tillen
- \_ Niet naar voren bukken
- \_ Tijdelijk met een extra kussen slapen of verhoogd hoofdeinde
- \_ U wordt morgen door de assistente van de polikliniek dermatologie gebeld.

### 4. Bij problemen

Lichte lekkage van bloed of wondvocht door de pleister heen is mogelijk.

***Alleen de aangekruiste instructies gelden voor u.***