

Bloedverdunners rondom ingreep, behandeling of onderzoek

Naam:

Geboortedatum:

MDN:

Ingreep/ onderzoek:

(Voorlopige) datum ingreep/ onderzoek:

Inleiding

U ontvangt deze folder omdat u binnenkort een ingreep, behandeling of onderzoek in Amphia krijgt en u bloedverdunners (antistollingsmedicijnen) gebruikt. Deze medicijnen zorgen ervoor dat u minder kans heeft op het krijgen van bloedstolsels in uw bloedvaten (trombose).

In deze folder kunt u lezen hoeveel dagen voor de, ingreep, behandeling of het onderzoek u moet stoppen met uw bloedverdunners. Of dat u uw bloedverdunner juist door moet gebruiken.

Na de ingreep, behandeling of het onderzoek begint u weer met de bloedverdunner(s). Uw arts bespreekt wanneer u weer mag beginnen. Gebruikt u Acenocoumarol of Fenprocoumon? U krijgt een doseerschema voor het beginnen met deze bloedverdunners.

Belangrijk!

Bij veranderingen in het gebruik van uw bloedverdunners moet u altijd contact op te nemen met uw behandelend arts. Als u een medicijnrol heeft (ook wel baxterrol) moet u aan uw apotheek de datum van uw ingreep/ behandeling onderzoek doorgeven.

Soort bloedverdunner:		Dit moet u doen:
<p>VKA - Vitamine K-antagonisten</p>	<p>Acenocoumarol</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 3 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><input type="checkbox"/> 3 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen en tijdelijk vervangen door spuitjes met kortwerkende bloedverdunner (Nadroparine (Fraxiparine®)):</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p> <p>Belangrijk! Geef aan uw trombosedienst door dat u een ingreep/behandeling/onderzoek krijgt waarvoor de bloedverdunders tijdelijk gestopt moeten worden. Neem uw doseerschema van de trombosedienst mee naar het ziekenhuis.</p>

<p>VKA - Vitamine K-antagonisten</p>	<p>Fenprocoumon</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><input type="checkbox"/> 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen en tijdelijk vervangen door spuitjes met kortwerkende bloedverdunner (Nadroparine (Fraxiparine®)):</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p> <p>Belangrijk! Geef aan uw trombosedienst door dat u een ingreep/behandeling/onderzoek krijgt waarvoor de bloedverdunders tijdelijk gestopt moeten worden. Informeer uw trombosedienst over geplande operatie. Neem uw doseerschema van de trombosedienst mee naar het ziekenhuis.</p>
<p>DOAC - Directe orale anticoagulantia</p>	<p>Dabigatran (Pradaxa®)</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 1/ 1,5/ 2/ 3/ 4* dag(en) voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>

<p>DOAC - Directe orale anticoagulantia</p>	<p>Apixaban (Eliquis®)/ Rivaroxaban (Xarelto®)</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 1/ 1,5/ 2* dag(en) voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>
<p>DOAC - Directe orale anticoagulantia</p>	<p>Edoxaban (Lixiana®)</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 1/ 2* dag(en) voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>
<p>LMWH – Low Moleculair Weight Heparine</p>	<p>Nadroparine (Fraxiparine®)</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 12/ 24* uur voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>
<p>LMWH – Low Moleculair Weight Heparine</p>	<p>Enoxaparine</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 12/ 24* uur voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>

<p>Pentasaccharide</p>	<p>Fondaparinux (Arixtra®)</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 36 uur voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>
<p>TAR - Trombocytenaggregatiemmers</p>	<p>Acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>
<p>TAR - Trombocytenaggregatiemmers</p>	<p>Dipyridamol</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 1 dag voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>
<p>TAR - Trombocytenaggregatiemmers</p>	<p>Clopidogrel (Grepid, Plavix®)</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><input type="checkbox"/> 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen en tijdelijk vervangen door acetylsalicylzuur 80mg 1dd</p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>
<p>TAR - Trombocytenaggregatiemmers</p>	<p>Prasugrel (Efient®)</p>	<p><input type="checkbox"/> Doorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> 7 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...</p>

TAR - Trombocytenaggregatiere mmers	Ticagrelor (Brilique®)	<input type="checkbox"/> Doorgaan <input type="checkbox"/> 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzo ek stoppen <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ...
--	------------------------	--