

Chirurgische verwijdering van tanden en/of kiezen (met verdoving)

Soms wordt u doorverwezen naar de kaakchirurg voor het verwijderen van tanden of kiezen (extractie). Wij hebben alles in huis om deze behandeling zo aangenaam mogelijk voor u te maken. Deze ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving, net als bij de tandarts.

Vorbereiding

Als wij een verwijsbrief van u hebben ontvangen, dan krijgt u van ons een afspraak toegestuurd. Deze kunt u terugvinden op MijnAmphia. Hier kunt u ook uw vragenlijst invullen. Op de dag van de afspraak neemt u uw legitimatie mee en eventueel een lijst met medicatie die u gebruikt. Meestal maken we eerst een röntgenfoto. Dat is nodig om een goed behandelplan te maken. Tijdens het gesprek met de arts komt u samen tot een behandelplan. Vaak kunnen we u direct behandelen. Soms is het nodig om een nieuwe afspraak te maken. De arts bespreekt dit met u. Indien er zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant (verstands)kiezen moeten worden verwijderd, dan zal dit bijna altijd in twee behandelingen gebeuren met een tussentijd van tenminste 6 weken. Boven en onder aan dezelfde kant kan meestal wel in één behandeling.

Wanneer dat nodig is, krijgt u een recept mee voor pijnstillers, een mondspoelmiddel en eventueel andere medicatie.

Behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan de balie. De assistente brengt u naar de behandelkamer. U krijgt daar een verdoving die vergelijkbaar is met die bij de tandarts. Vertel het ons als u angstig bent, dan kunnen we hier rekening mee houden. We dekken u toe met steriele doeken, zodat wij zo schoon mogelijk kunnen werken. Tijdens de behandeling kunt u geluidjes horen en kunt u veel druk in uw mond ervaren. Deze behandeling mag geen pijn doen. Wanneer u dat wilt, geeft de assistente u tijdens de behandeling uitleg over wat we aan het doen zijn. Tot slot krijgt u een gaasje in uw mond om het bloeden te stelpen. Hier moet u minimaal een half uur op dichtbijten.

Nazorg

Na de behandeling legt de assistente u uit wat u moet doen:

- Een halfuur op het gaasje bijten.
- Een pijnstiller innemen.
- Koelen.
- Na 24 uur starten met het mondspoelmiddel (vijf dagen, twee keer per dag na de maaltijd).

- De zwelling in de gaten houden (deze is op de derde dag het hevigst, daarna moet het minder worden).
- Normaal uw tanden poetsen.
- De hechtingen na een week mee poetsen (die verdwijnen vanzelf).
- Niet in de zon gaan zitten.
- Niet roken.
- Zolang de verdoving werkt niet eten, koffie en thee goed laten afkoelen.
- Er rekening mee houden dat uw mond minder ver open kan dan u gewend bent.

U krijgt ook een folder mee met deze informatie. We maken zo nodig een vervolgspraak.

Maakt u zich zorgen over het verloop van uw herstel? Dan mag u gerust contact met ons opnemen.

In onze folder vindt u meer informatie over uw behandeling op de polikliniek.

- [Poliklinische kaakchirurgische ingrepen](https://www.amphia.nl/folders/mka-poliklinische-kaakchirurgische-ingrepen)(<https://www.amphia.nl/folders/mka-poliklinische-kaakchirurgische-ingrepen>)

Meer lezen over mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) in Amphia?

[Ga naar afdeling MKA](https://www.amphia.nl/afdelingen/mka) (<https://www.amphia.nl/afdelingen/mka>)